


Anna Iossa

Dati sui Ca invasivi a Firenze


Viene riportata copia della videoprotezione presentata nel corso della relazione

Trends di Incidenza per Tumori Uterini Provincia di Firenze e Prato - 1985-1997




Revisione cause di Mortalità per Tumori Uterini Province di Firenze e Prato- 1985-1998


Prima incrocio RTT



Dopo incrocio RTT



Dopo riattribuzione




◆ NON SPECIF.


◆ CERVICIE

◆ CORPO

Trends di Mortalità per Tumori Uterini Province di Firenze e Prato- 1985-1998



Storia di Screening dei K invasivi Provincia di Firenze e Prato 1994-1997



CANCRI INTERVALLO

DEFINIZIONE


Tutti i casi di carcinoma della cervice uterina insorti in donne con un pap-test nell'intervallo di screening, qualsiasi fosse il risultato del pap test e degli eventuali accertamenti successivi.

K Intervallo
1994-1997 Province di Firenze e Prato


Intervallo	Numero	Screendetected
< 3 aa	21	8
>=3<5 aa	15	6
Totale	36	14

**K Intervallo: distribuzione per morfologia
Firenze e Prato 1994-1997**

<3 aa




>=3<5aa




■ Squamoso ■ Adenok ■ Altri ■ No isto


**K Intervallo: distribuzione dei K squamosi
per grado di invasione
(Firenze e Prato 1994-1997)**


<3 aa




 Invasivi

>=3<5aa



 Microinvasivi

K squamosi: distribuzione per grado di invasione
(Firenze e Prato 1994-1997)




Risultati 1° e 2° livello precedente la diagnosi di K
(INTERVALLO <3aa)



Casi Intervallo <3aa

distribuzione per istologia dei casi con citologia negativa



Tassi di K di intervallo della cervice uterina (1994-1997 fascia età 25-69 anni)

Intervallo	Tasso grezzo
0-3 anni	4.2/100.000
4-5 anni	7.6/100.000